

Patiënteninformatie

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om SPECI CHOL SPAG. PEKANA® zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

SPECI-CHOL SPAG. PEKANA®

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® gebruikt.
3. Hoe wordt SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u SPECI-CHOL SPAG. PEKANA®?

Samenstelling van SPECI-CHOL SPAG. PEKANA®

De bestanddelen per 100 gram druppels zijn:

Chionanthus virginica	D6	12,5 g
Eichhornia crassipes	D4	14,5 g
Hedera helix spag.	D12	8,5 g
Iberis amara	D4	14,5 g
Iris versicolor	D6	12,5 g
Nux moschata	D4	16,5 g
Phosphorus	D12	8,5 g
Glechoma hederacea spag.	D6	12,5 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water.

Alcoholgehalte ca. 30% (v/v)

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

PEKANA®-Naturheilmittel GmbH,
Raiffeisenstrasse 15, 88353 Kisslegg
Telefoon: 00 49-75 63-9 11 60, Telefax: 00 49-75 63-28 62
E-mail: info@pekana.com

Voor informatie

TIMM Health Care B.V.
Tel.: 030 - 2814472

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 91719

1. Wat is SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® en waarvoor worden het gebruikt?

Toepassingen

APO-STOM SPAG. PEKANA® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. Wat moet u weten voordat u SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® gebruikt?

Wanneer mag u SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met SPECI-CHOL SPAG. PEKANA®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® ingenomen/gebruikt?**Dosering en gebruik**

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (2-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per 10 druppels.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u SPECI-CHOL SPAG. PEKANA®?

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °C.

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten.

SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® buiten bereik en zicht van kinderen houden!**Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik SPECI-CHOL SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter "niet te gebruiken na" (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 07/2012.

074/nl-V2